

L'impact de la césarienne sur l'initiation, la durée et les difficultés de l'allaitement dans les quatre premiers mois du post-partum.

Au Canada, le taux de césarienne est supérieur aux recommandations de l'OMS en 2009. Or, on sait que des les césariennes peuvent affecter défavorablement le début de l'allaitement, la quantité de lait produite et la réceptivité du nourrisson comparé aux naissances par voie vaginale.

Cette étude examine le mode d'accouchement et l'initiation de l'allaitement, sa durée et ses difficultés rapportées par des mères à 4 mois du post-partum.

- [Lire l'article](#) (en libre accès au 26/06/17)

Hobbs AJ, Mannion CA, McDonald SW, Brockway M, Tough SC. **The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum.** *BMC Pregnancy and Childbirth.* 2016;16:90.

Cet article est également disponible sur demande chez IPA.

Pour aller plus loin :

[Corrélation entre césariennes multiples, tabagisme et durée de l'allaitement](#)

[L'allaitement peut protéger des douleurs chroniques post-césarienne](#)

[Accouchement, allaitement et effet protecteur sur le métabolisme via l'allaitement](#)

[Nomogrammes de la perte de poids précoce chez les bébés exclusivement allaités \(selon le mode d'accouchement\)](#)

Publié par : KNM., Documentaliste IPA.